



# ΒΙΟΨΙΑ ΝΕΦΡΟΥ




Εικ. 1: Σημαντικά διογκωμένα / υπερτροφικά σπειράματα με μέτρια – ικανή υπερπλασία της διάμεσης ουσίας του μεσαγγείου με ανομοιογενή κατανομή. Επίταση της λοβίωσης των σπειραμάτων, ενδοτριχοειδική υπερπλασία με συμπαγοποίηση λοβίων και συμφυτικές αλλοιώσεις με την κάψα Bowman οι οποίες σε ορισμένα προσλαμβάνουν εικόνα μικρού μεγέθους ινοκυτταρικών μηνοειδών σχηματισμών (crescents).




Εικ. 2: Διάχυτη πάχυνση - ακαμψία των τριχοειδικών τοιχωμάτων που οφείλεται σε αλλοιώσεις μεμβρανώδους σπειραματονεφρίτιδας ιστολογικού σταδίου (stage ) II και εστιακά III οι οποίες χαρακτηρίζονται από την παρουσία υποεπιθηλιακών εναποθέσεων και ακανθωδών προσεκβολών (spikes) της βασικής μεμβράνης.

# ***ΒΙΟΨΙΑ ΝΕΦΡΟΥ***



C3



IgM

Μέτρια έντονη (++) έως έντονη (+++) συνδυασμένη / μικτή καθήλωση όλων των ανοσοσφαιρινών, των κλασμάτων του συμπληρώματος C1q, C3 & C4, και των ελαφρών αλυσσεων, με την μορφή συρρεόντων μικρών ή μεγαλύτερου μεγέθους κόκκων κατά μήκος των τριχοειδικών τοιχωμάτων του συνόλου των σπειραμάτων, με τμηματική ή ολοσπειραματική κατανομή

# ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

**ANA:1/640**

Μεμβρανώδης  
σπειραματονεφρίτιδα, τμηματική  
εστιακή, ενδοτριχοειδική και  
μεσαγγειοϋπερπλαστική  
σπειραματονεφρίτιδα

**ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ  
ΣΕΛ  
ΤΑΞΗΣ III/V  
(ISN/RPS)**

