

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ
ΚΑΨΟΥΛΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΔΙΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΝΟΣΟ CROHN:
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΑΖΗΣ Ν, ΤΣΟΥΚΑΛΗ Ε, ΠΟΝΤΑΣ Χ,
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ Γ, ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Χ,
ΓΚΕΡΟΣ Φ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Γ, ΒΡΑΚΑ Μ,
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ Κ, ΜΟΥΝΤΑΚΗ Κ, ΜΕΛΑ Μ,
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Α, ΑΡΧΑΥΛΗΣ Ε, ΒΙΕΝΝΑ Ε,
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γ.

Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»



ΕΙΣΑΓΩΓΗ



- ✓ Η εντεροσκόπηση με κάψουλα αποτελεί εξέταση εκλογής για τον έλεγχο του λεπτού εντέρου σε ασθενείς με διεγνωσμένη νόσο Crohn

ΣΚΟΠΟΣ

- Να διερευνηθεί η συμβολή της εντεροσκόπησης με κάψουλα λεπτού εντέρου στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων σε ασθενείς με διεγνωσμένη νόσο Crohn.

ΜΕΘΟΔΟΙ

- Αναδρομική ανάλυση σε προοπτικά συλλεγέν
αρχειακό υλικό [Μάρτιος 2003 - Μάρτιος 2019]
των δεδομένων ασθενών με διεγνωσμένη νόσο
Crohn που υποβλήθηκαν σε εντεροσκόπηση
με κάψουλα στο Τμήμα μας (τριτοβάθμιο
κέντρο αναφοράς) και των θεραπευτικών
παρεμβάσεων που ακολούθησαν.


ΜΕΘΟΔΟΙ

- Όλοι οι ασθενείς είχαν επιβεβαιωμένη νόσο Crohn του παχέος εντέρου ή του τελικού ειλεού, που διαγνώστηκε μετά από ειλεο-κολονοσκόπηση και ιστολογικές εξετάσεις.
- Οι κάψουλες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Pillcam SB.



ΚΑΨΟΥΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ευρήματα συμβατά με νόσο Crohn



aphthous ulcers (A), surface erosions (B), aphthoid erosions (C)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

839 ασθενείς

Μέση ηλικία	36 έτη (range 17–78)
Άντρες	471 (56.14%)
Μέση διάρκεια νόσου	6 έτη

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ

Εκτίμηση της έκτασης της νόσου

Εκτίμηση της επούλωσης του βλεννογόνου

Εκτίμηση κλινικής υποτροπής

Διερεύνηση σιδηροπενικής αναιμίας

ΕΙΛΕΟ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

618 ασθενείς (73.65%)


κολίτιδα
219
(26.10%)

ειλεο-
κολίτιδα
253
(30.15%)

τελική
ειλεϊτιδα
146
(17.40%)

ΚΑΨΟΥΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ασθενείς στους οποίους
δεν ελέγχθηκε το λεπτό έντερο
στην κολονοσκόπηση



Προσβολή λεπτού εντέρου



ΚΑΨΟΥΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ



Η εντεροσκόπηση με κάψουλα
ανέδειξε βλάβες πέραν του τελικού ειλεού
σε 105/618 (16.99%) ασθενείς,
στους οποίους η ειλεο-κολονοσκόπηση
είχε ελέγξει το παχύ έντερο και τον τελικό ειλεό

ΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

98 ασθενείς



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ



- Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις ήταν πιο συχνές στους ασθενείς στους οποίους ανευρέθηκαν βλάβες στο λεπτό έντερο κατά τη διάρκεια της κάψουλας και στους οποίους ο τελικός ειλεός δεν είχε ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης [57/96 ασθενείς έναντι 41/105, $p=0.003$]

ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ

Corticosteroids
= 6

Push
enteroscopy
= 1

Surgery
= 2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

- Η κάψουλα του λεπτού εντέρου έχει σημαντική συμβολή στη λήψη θεραπευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με διεγνωσμένη νόσο Crohn, ειδικά σε εκείνους στους οποίους ο τελικός ειλεός δεν έχει ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης.

Ευχαριστώ

