



Οστεομυελική βιοψία




H&E, 20x


H&E, 600x



ανοσοχρώση
γλυκοφορίνης,
600x



Παρασκεύασμα θυμεκτομής



H&E, 20x

H&E, 200x
σωμάτιο Hassal

Λεμφοζιδιακή υπερπλασία θύμου

≠ αληθής υπερπλασία θύμου

Υπερπλασία B-λεμφοκυττάρων περιαγγειακού (εξωπαρεγχυματικού) χώρου.

myasthenia gravis > ΣΕΛ, ΡΑ, σκληρόδερμα, Churg-Strauss, θυρεοτοξίκωση ...



Λεμφοζιδιακή υπερπλασία θύμου + PRCA

	28 / ♀ Am J Clin Pathol. 1995 Mar;103(3):346-7	57 / ♀ J Neurol Sci. 2004 Sep 15;224(1-2):93-5	27 / ♀ Saudi Med J. 2007 May;28(5):798-9
Ιστορικό	νεφρική ανεπάρκεια	myasthenia gravis - θυμεκτομή	ελεύθερο
Σχόλια	ανάκαμψη ερυθροποίησης μετά θυμεκτομή	- PRCA 26 έτη μετά θυμεκτομή - CD8+ λεμφοκυττάρωση	?βαθμός υποπλασίας της ερυθράς? ανάκαμψη ερυθροποίησης μετά θυμεκτομή