

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΔΥΣΔΙΑΓΝΩΣΤΟ ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Δώμα Ευαγγελισμού

18/03/2015

Ογκολογική Κλινική

Διευθυντής: Μ. Βασλαματζής

Παρουσίαση: Θ. Τέγος

Παρουσίαση περιστατικού

- Άνδρας (Β.Α.), 59 ετών, διακομίστηκε από Νομαρχιακό Νοσοκομείο για έλεγχο από 7ετίας αναφερόμενων διαρροϊκών κενώσεων.

Ατομικό/Κοινωνικό αναμνηστικό

- Σ.Δ II από το 2009 υπό αντιδιαβητικά δισκία
- Επεισόδια κωλικών νεφρού, λόγω ουρολιθίασης-λιθοθρυψία
- Δεν αναφέρονται αλλεργίες σε φάρμακα ή τροφές
- Κάπνισμα: 70py
- Αλκοόλ: 2-3 μπύρες ημερησίως(διέκοψε 2013)
- Επάγγελμα: συνταξιούχος επαγγελματίας οδηγός

Κληρονομικό ιστορικό

- Ο πατέρας του πέθανε από άγνωστη αιτία.
- Η μητέρα του πέθανε σε ηλικία 65 ετών από Π.Μ.
- Ένας αδελφός(54 ετών) αναφέρει διαρροϊκά επεισόδια.
- Ο άλλος αδελφός (48 ετών) είναι υγιής.

Αντικειμενική εξέταση

- Καλή γενική κατάσταση, με καλή θρέψη
- Α.Π 120/70 mmHg, σφύξεις 78/min
- Πληκτροδακτυλία α.άκρων άμφω(αναφέρεται από παιδικής ηλικίας)
- Ευαισθησία επιγαστρίου στην εν τω βάθει ψηλάφηση
- Ήπαρ μόλις ψηλαφητό
- Σπλήνας, λεμφαδένες μη ψηλαφητοί
- Δακτυλική εξέταση ορθού-προστάτου κ.φ.
- Καρδιοπνευμονική και νευρο-μυική σημειολογία σε φυσιολογικά πλαίσια

Παρούσα νόσος

- Προ 7ετίας(2006), εμφάνισε διαρροϊκές κενώσεις(1-2 ημερησίως, μεγάλες, υδαρείς, ανεξαρτήτως λήψης τροφής,καθ'όλο το 24ωρο),που αποδόθηκαν σε ευερέθιστο έντερο
- Χορηγήθηκαν PPIs με εντυπωσιακή ανταπόκριση.
- Διακοπή τους συνοδεύτηκε από επανεμφάνιση διαρροιών.

Εργαστηριακός έλεγχος

- ◎ **Αιματολογικός:** WBCs : 7070/μl (45%poly,39% lymph), Hb:11gr/dl (MCV:83,MCH:28), PLTs:256.000/μl, με φυσιολογικούς χρόνους πήξης
- ◎ **Βιοχημικός:** Ur:58mg/dl,creat:1.15mg/dl, Na:135mmol/lit, K:4,8mmol/lit, Alb:3gr/dl, AST:15IU/lit, ALT:13IU/lit, ALP:103IU/lit, γGT:33IU/lit, LDH:150IU/lit, αμυλάση:79IU/lit, Ca:10.4mg/dl, P:3.6mg/dl, CRP:3.4mg/dl, TKE:35mm/h.
- ◎ Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων κ.φ.
- ◎ **Μικροβιολογικός:**Οι καλλιέργειες και παρασιτολογικές κοπράνων ήταν αρνητικές.

Ενδοσκοπικός έλεγχος πεπτικού

- ◎ Γαστροσκόπηση(04/2007): γαστρίτιδα άντρου,ήπια 12δακτυλίτιδα,οισοφαγίτιδα grII, βιοψίες 2^{ης} μοίρας 12δακτύλου κ.φ.
- ◎ Κολοσκόπηση(01/2008) : πολλαπλοί υπερπλαστικοί πολύποδες π.ε.(κατιόν,σιγμοειδές,ορθό), αφαιρέθηκαν 10.
- ◎ Κολοσκόπηση(01/2011): οίδημα,υπεραιμία εντ.βλεννογόνου και 2 μικροί υπερπλαστικοί πολύποδες

Πορεία νόσου

- Από την έναρξη των διαρροιών μέχρι αρχών 2013 υποβάλλονταν σε περιστασιακή συμπτωματική αγωγή και λήψη PPIs.
- Τον 04/2013 εμφάνισε πολλές, υδαρείς διαρροϊκές κενώσεις και χολώδεις εμέτους με έντονες επιγαστρικές ενοχλήσεις και εισήχθη σε τοπικό νοσοκομείο.
- Αρχικά αποδόθηκε σε γαστρεντερίτιδα
- Λόγω εμμονής συμπτωμάτων και του ιστορικού του διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό.

Τελικώς...

- Λόγω απουσίας πυρετού υποβλήθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο,ο οποίος οδήγησε στον περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο...