



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΡΙΑ: Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ**

**ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - «ΔΩΜΑ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (11^{ος})**

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 13³⁰ - 15⁰⁰

ΘΕΜΑ: «Ψύχωση και επιληψία: Σπανία περίπτωση ασθενούς με εναλλαγή επεισοδίων»

Παρουσίαση/Σχολιασμός: Γ. Παπαγεωργίου, Διευθυντής, Ψυχιατρικό Τμήμα

- Άγαμη, ζει με τους γονείς της
- Μάρτυς του Ιεχωβά
- Παρακολουθείται από το 2004
- Εκείνη την εποχή παρουσίασε μετά από περίοδο απομόνωσης:
 - αποδιοργανωμένη συμπεριφορά
 - διωκτικό / ερωτομανιακό παραλήρημα
- Διαταραχές συμπεριφοράς από την ηλικία των 25 ετών
 - Κολλώδης συμπεριφορά και ενασχόληση με την θρησκεία
 - Παρανοειδής ετοιμότητα
- Διάγνωση επιληψίας τύπου Petit-Mal την εποχή αυτή

Από 4ετίας τουλάχιστον λαμβάνει:

Λεβετιρακετάμη 1500 χλγ/ημ, λαμοτριγίνη 200 χλγ/ημ

- Αποκαλυπτικό παραλήρημα, ερωτομανιακές ιδέες με συνάδελφό της , παρανοειδής ιδεασμός , απομόνωση
- Αρχικά υποβόσκοντα συμπτώματα που οδήγησαν σε νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική για 2 μήνες
- Μετεφέρθη παρ'ημίν
- Εξήλθε υπο aloperidin decanoas 3κ εκ /20 ημ
- Έκτοτε και επί 11ετία παρακολουθείται παρ'ημίν
- Η εικόνα της παρουσιάζει ποικιλία διακυμάνσεων της διάθεσης (αγχώδης) αλλά και του παρανοειδούς ιδεασμού

- Μεγάλη αϋπνία
- Το ενέσιμο υπεκατεστάθη από Risperdal Consta το 2006 λόγω εξωπυραμидικών συμπτωμάτων
- Το ΗΕΓ σε σειρά εξετάσεων έδειξε διάχυτη ανωμαλία «Ε» τύπου
- Βαθμιαία έγινε εμφανής μία κατά καιρούς επιδείνωση της ψυχοπαθολογίας της
- Διωκτικές ιδέες , εκσεσημασμένες ιδέες αναφοράς
- Παρατηρήθη όμως εκ των υστέρων κλινικά ότι η **προσοχή** και η **συγκέντρωσή** της ήταν βελτιωμένες σε σχέση με την περίοδο που ενεφάνιζε σχετική ύφεση της ψυχοπαθολογίας της
- Δεν εγένοντο ουσιαστικές αλλαγές στην θεραπεία της
- Αντί Ε ή αντιψυχωσική θεραπεία
- Προ διετίας επίσης παρατηρήθη ότι κατά την περίοδο που ήταν σε ύφεση η ψυχοπαθολογία της είχε περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από το εξωπυραμидικό ως και ακαθισία
- Προστέθη Akineton & Inderal
- Μειώθηκε το risperdal Consta από 37,5 σε 25 χλγ/15ημ
- Η ψυχοπαθολογία της επιδεινώθηκε με αγχώδη κύρια διάθεση
- Άμεση συμπλήρωση ρισπεριδόνης από το στόμα (2 χλγ)
- Ιδέες ανιάτου και απελπισίας με ευχές θανάτου με την βελτίωση του ιδεασμού (κατάθλιψη?)
- Ετέθη Σερτραλίνη (100 χλγ/ημ) που την λαμβάνει έως σήμερα
- Θα συζητηθεί εάν και κατά πόσον οι εξαρσοϋφέσεις της νόσου ήταν συνδεδεμένες με την επιληπτική διαταραχή