

Άνδρας 71 ετών με μάζα ελάσσονος πυέλου

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ' Χειρουργικό Τμήμα
Παπατριανταφύλλου Ανδρέας



ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ:

Άνδρας 71 ετών εισήχθη στην κλινική μας λόγω

- 1) μάζας κάτω κοιλίας, διαστάσεων 15x13 cm, με σαφή όρια και εντός της ελάσσοнос πυέλου και
- 2) οζώδους υπερπλασίας αριστερού επινεφριδίου διαστάσεων 1,8x3 cm.

Οι μάζες ανευρέθησαν μετά από διενέργεια αξονικής τομογραφίας, στο πλαίσιο διερεύνησης αιματοουρίας και δυσουρικών ενοχλημάτων.



Ex: 7713
Se: 4
KV 120.50
Ia: 50-C
D10V 30.7cm
STND/+
N 70 7713
DOC: 01 Jan 1946
15 Jul 2016
512



Ex: 7713
Se: 4
KV 120.50
Ia: 50-C
D10V 30.7cm
STND/+
N 70 7713
DOC: 01 Jan 1946
15 Jul 2016
512



BrightSpeed SVS8c159
Ex: 7713
Se: 4
KV 120.50
Ia: 50-C
D10V 30.7cm
STND/+
N 70 7713
DOC: 01 Jan 1946
15 Jul 2016
512



BrightSpeed SVS8c159
Ex: 7713
Se: 4
KV 120.50
Ia: 50-C
D10V 30.7cm
STND/+
N 70 7713
DOC: 01 Jan 1946
15 Jul 2016
512





ErlightSpeed S750ct59
Ex: 7713
Se: 4
KV 1200.50
Ic: 70-C
D109 30.7cm
SIN0/+

A 100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ
7 20 7713
DHC: 01 Jan 1946
15 Jul 2016
512

ErlightSpeed S750ct59
Ex: 7713
Se: 4
KV 1200.50
Ic: 70-C
D109 30.7cm
SIN0/+

A 100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ
7 20
DHC: 01 Jan
15 Jul
512



Κατά την εισαγωγή του...

- (+)Οικογενειακό ιστορικό ΣΕΥ (αδερφή)
- Ιστορικό χειρουργικής αποκατάστασης υποσπαδία σε ηλικία 38 ετών
- Υποπλαστικά γεννητικά όργανα
- Ψηλαφητή μάζα στην κάτω κοιλία
- Χωρίς παθολογικά ευρήματα κατά τον τυπικό προεγχειρητικό έλεγχο (CXR, ΗΚΓ, γεν. αίματος, βιοχημικός έλεγχος, έλεγχος πηκτικότητας)

ΑΛΛΑ:

Ο ασθενής δε συναίνεσε στη διενέργεια οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας, διαγνωστικής και θεραπευτικής, σχετικά με το μόρφωμα του αριστερού επινεφριδίου.



Στο χειρουργείο:


- Αδυναμία τοποθέτησης ουροκαθετήρα (Folley και Tiemann) που πιθανολογήθηκε ότι οφείλεται σε στένωση ουρήθρας, σχετιζόμενη με το προηγηθέν χειρουργείο. Κρίθηκε σκόπιμη η διενέργεια υπερηβικής κυστεοστομίας διεγχειρητικά, προς αποφυγή τραυματισμού της ουρήθρας.




Στο χειρουργείο:

- Προσπέλαση με μέση υπερ-υποομφάλια τομή.
- Ανεύρεση ευμεγέθους μάζας ελάσσοнос πυέλου, σκληρής, κινητής και μη συμφυόμενης με τα πέριξ όργανα, καθώς και δύο ανατομικών δομών εκατέρωθεν της μάζας που συνεξαιρέθηκαν en bloc με το παρασκεύασμα
- Σαφής αναγνώριση ουρητήρων
- Υπερηβική κυστεοστομία
- Αποστολή παρασκευάσματος για παθολογοανατομική εξέταση.







Λόγω των διεγχειρητικών ευρημάτων μετά το πέρας της χειρουργικής επέμβασης έγινε ενδελεχής ψηλάφηση του οσχέου, χωρίς να καταστεί δυνατό να ψηλαφηθούν όρχεις. Κατά την επισκόπηση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς ανατομικές ανωμαλίες της περιγεννητικής περιοχής, πλην της ήδη γνωστής υποπλασίας των γεννητικών οργάνων.



Μετεγχειρητικά:

- Άμεσα μετεγχειρητικά ο ασθενής παρουσίαζε ούρηση εκ της ουρήθρας αντί της κυστεοστομίας → περιοδικός αποκλεισμός του καθετήρα κυστεοστομίας και τελικά αφαίρεσή του.
- Στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο ο ασθενής έλαβε αγωγή με υδροκορτιζόνη i.v., λόγω του οικογενειακού ιστορικού ΣΕΥ και της συμβατης κλινικής εικόνας του ιδίου. Μετά την έναρξη σίτισης του, η αγωγή τροποποιήθηκε σε p.os., αλλά ο ασθενής αρνήθηκε να λάβει την χορηγούμενη και προτεινόμενη από τους θεράποντες ιατρούς αγωγή.



Μετεγχειρητικά:

- U/S οσχέου : δεν ανευρέθησαν όρχεις εντός του οσχέου
- Ομαλή MTX πορεία χωρίς επιπλοκές.
- Συνεστήθη μεταφορά στην ενδοκρινολογική κλινική για περαιτέρω έλεγχο. Ο ασθενής αρνήθηκε.
- Έλαβε εξιτήριο με οδηγίες για αγωγή με υδροκορτιζόνη και αναμονή αποτελεσμάτων ιστολογικής εξέτασης.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

