

- **U/S θυρεοειδούς:** διόγκωση του θυρεοειδούς αδένος ιδιαίτερα δεξιά με παρουσία ευμεγεθών εστιακών αλλοιώσεων, παθολογική διόγκωση λεμφαδένων στις καρωτιδικές αλυσίδες άμφω με διόγκωση των υπογναθίων λεμφαδένων και μικρότερους λεμφαδένες στους υπερκλείδιους βόθρους άμφω
- **Θυρεοειδεκτομή + λεμφ καθαρισμός**
- **Ιστολογική** θηλώδες καρκίνωμα, θυλακιώδους ποικιλίας δεξιού και αριστερού λοβού θυρεοειδούς με εξωθυρεοειδική επέκταση και μεταστατική διήθηση συνολικά 7 τραχηλικών λεμφαδένων (7/39)».


150 mCi ¹³¹I 150 mCi ¹³¹I



Εξετάσεις	8/2018	04/17	7/2016	04/16	6/2015	04/15	10/2014	4/2014	05/14	11/13	04/13	10/2012	2/2012
TSH_Icma	0.37	3.68	4.91	1.67	0.354	2.58		0.16	15.5	1.73	>100.0	>100.0	>100.0
Anti Tg	<10	13.75	14.34	20.21	15.09	29.01		10	12.1	<10.00	19.61	14.49	40.26
Tg-Icma	<<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	10.47	17.56	1330



U/S τραχήλου: -



- ύποπτος υπερηχογραφικά όζος θυρεοειδούς και λεμφαδένας δεξιάς πλάγιας τραχηλικής χώρας.
- Η κυτταρολογική εξέταση του όζου ήταν θετική για θηλώδες Ca (Betesda VI) ενώ η κυτταρολογική εξέταση του λεμφαδένα ήταν αρνητική για κακοήθεια.
- ολική θυρεοειδεκτομή
- Η ιστολογική εξέταση «
 - θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς. 13 χιλιοστά ,
 - δύο ενδοπαρεγχυματικές καρκινωματώδεις εστίες θηλώδους καρκινώματος μ.δ. περί το 1 χιλιοστό έκαστη.
 - καρκινωματώδη έμβολα σε λεμφαγγεία και σε μικρού μεγέθους αιμοφόρο αγγείο,
 - δύο καρκινωματώδεις εστίες μ.δ. 1,5 και 0,5 χιλιοστά στον πέριξ ινολιπώδη ιστό
 - ολοι οι ανευρεθέντες λεμφαδένες (3) εμφανίζουν μεταστατική διήθηση από το παραπάνω καρκίνωμα με εξωλεμφαδενική επέκταση στον μεγαλύτερο εξ'αυτών».
- Λόγω της παρουσίας λεμφαδενικών μεταστάσεων και εξωθυρεοειδικής επέκτασης αποφασίστηκε η χορήγηση 100 mCi ¹³¹I μακράν αγωγής. Από την κλινική εξέταση κατά τη νοσηλεία του δε διαπιστώθηκε ψηλαφητό μórφωμα στον τράχηλο. Η Tg ήταν πολύ αυξημένη (200 ng/ml) με αρνητικά anti-Tg. Στο μεταθεραπευτικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα παρατηρούνται 3 τουλάχιστον ευμεγέθεις εστίες εκλεκτικής καθήλωσης του ρ/φ στην πρόσθια τραχηλική χώρα και στην περιοχή της σφαγής.
- Με βάση τα παραπάνω το καρκίνωμα είναι μέτριου κινδύνου υποτροπής.

150 mCi ¹³¹I



Εξετάσεις	2/12/2019	7/10/2018	27/12/17	16/08/17	4/12/2017	1/9/2017
TSH_Icma	0.99	0.4	0.12		1.25	89.36
Anti Tg	10	16	<10	13.97		13.76
Tg	21.3	10.8	9.5	6.9	18	200

FNA λεμφ :
πιθανή
μικροδιήθηση



U/S τραχήλου : Δ
παρατραχειακά (III)
ύποπτος
λεμφαδένας 2 cm

WBS : 3 εστίες
στον τράχηλο